

# Paracetamol B. Braun

10 mg/ml infusionsvæske, opløsning



## Terapeutiske indikationer: <sup>1</sup>

- kortvarig behandling af moderat smerte, især efter operation
- kortvarig behandling af feber

Intravenøs administration er klinisk berettiget ved akut behov for behandling af smerte eller hypertermi, og/eller når andre administrationsveje ikke er mulige.

**Forsigtighed: risiko for overdosering med Paracetamol B. Braun 10 mg/ml infusionsvæske, opløsning, især hos børn som følge af forkert administration.**

Den administrerede dosis afhænger af patientens vægt.

Afhængig af barnets vægt kan de administrerede volumina være meget små.

## Administrationsoversigt:

	Nyfødte, spædbørn og børn ≤10 kg	Børn >10 kg og ≤33 kg	Børn, teenagere og voksne >33 kg og ≤50 kg	Teenagere og voksne >50 kg <u>uden</u> yderligere risikofaktorer for hepatotoksicitet	Teenagere og voksne >50 kg <u>med</u> yderligere risikofaktorer for hepatotoksicitet
<b>Dosis</b>	7,5 mg/kg dvs. 0,75 ml/kg	15 mg/kg dvs. 1,5 ml/kg	15 mg/kg dvs. 1,5 ml/kg	1000 mg dvs. 1 flaske 100 ml	1000 mg dvs. 1 flaske 100 ml
	7,5 mg/kg højst 4 gange dagligt	15 mg/kg højst 4 gange dagligt	15 mg/kg højst 4 gange dagligt	1000 mg højst 4 gange dagligt	1000 mg højst 3 gange dagligt
<b>Min. interval</b>	Minimum interval mellem hver administration: <u>4 timer</u>				
<b>Maks. pr. 24 timer</b>	30 mg/kg (uden at overskride 300 mg)	60 mg/kg (uden at overskride 2000 mg)	60 mg/kg (uden at overskride 3000 mg)	4000 mg	3000 mg
<b>Flaske</b>	50 ml flaske: 1 ml = 10 mg til patienter op til 33 kg		100 ml flaske: 1 ml = 10 mg til patienter >33 kg		

### Eksempel (op til 10 kg)

Vægt	Dosis til administration op til 4 gange dagligt		Maks. dosis pr. 24 timer	
2 kg	15 mg	1,5 ml	60 mg	6 ml
4 kg	30 mg	3,0 ml	120 mg	12 ml
6 kg	45 mg	4,5 ml	180 mg	18 ml
8 kg	60 mg	6,0 ml	240 mg	24 ml
10 kg	75 mg	7,5 ml	300 mg	30 ml

- Hos børn med lav vægt kan paracetamol fortyndes op til en tiendedel med 0,9 % natriumkloridopløsning eller 5% glucoseopløsning
- Ved fortynding er kemisk og fysisk stabilitet vist ved 23°C i 48 timer
- Husk, at nøje monitorering er nødvendig, især ved afslutningen af infusionen, for at undgå luftembolier.

Detaljeret information kan også findes i det aktuelle produktresumé (SPC).

Derudover er der et brev til sundhedspersonale samt en dosisberegner på <http://www.bbraun.dk/>

Referencer: <sup>1</sup> SPC Paracetamol B. Braun

