

# Prontosan® Sårskyllevæske, Prontosan® Sårigel og Prontosan® Sårigel X Til skylning og oprensning af sår med biofilm

## Indikation

- Fjernelse af belægninger og biofilm i kroniske, akutte og inficerede sår, samt stråle-skadet hud og kemisk udløste sår
- Prontosan® Sårskyllevæske/ Sårigel: 1.-2. grads forbrændinger
- Sårigel X: 1.-3. grads forbrændinger
- Reduktion af risikoen for infektion i såret
- Skyllevæske ifm. NPWTi-d
- Opløsning af fastgroede sårbandager


## Egenskaber

- Løser og fjerner fibrinbelægninger, cellerester, biofilm, nekrotisk væv mm.
- Forebygger infektion
- Sikrer et miljø der fremmer sårheling
- Reducerer hurtigt ubehagelig sår lugt
- Smertefrit for patienten
- Økonomisk i brug, helingstiden reduceres
- Holdbar i 8 uger efter anbrud, bortset fra Prontosan® sårskyllevæske ampul, der er til engangsbrug
- Til gentagen og langvarig brug
- Prontosan® Adaptor passer til V.A.C. VeraLink™ kassetten.


## Produktbeskrivelse

- Lugtfri, steril brugsklar opløsning bestående af polyhexanid og betain, i gelversioner tillige glycerol og hydroxyethylcellulose
- Høj vævstolerance
- Alle Prontosan® produkter er CE mærkede, klasse III, medicinsk udstyr

## Hvordan virker Prontosan®?



Traditionelle sårskyllemidler som saltvand, postevand og ringerlaktat lægger sig over biofilmen uden at fjerne den.



Prontosan® bryder biofilmens cyklus. Betain og polyhexanid renser såret, fjerner biofilmen og reducerer bakteriebelastningen.

Det overfladeaktive stof betain i Prontosan® Sårskyllevæske og Prontosan® Sårigel/Sårigel X trænger igennem, renser og løser sårbelægninger og biofilm, hvilket gør det nemmere at foretage en effektiv rensning. Polyhexanid reducerer bakteriebelastningen og virker mod et bredt spektrum af mikroorganismer (bakterier og svampe).

## Kun rene sår heler

Sårrensning er en forudsætning for, at såret kan hele. Sår behandlet med Prontosan® heler hurtigere sammenlignet med sår, der er behandlet med traditionelle sårskyllemidler<sup>2</sup>

## B. Braun har evidens for at Prontosan®:

- ✓ Forbedrer sårheling<sup>5</sup> og reducerer helingstiden<sup>11,15</sup> samt giver signifikant sårreduktion<sup>9</sup>
- ✓ Giver signifikant færre smerter ved bandageskift<sup>9</sup>
- ✓ Forebygger infektioner<sup>8</sup>
- ✓ Reducerer lugt fra såret<sup>11</sup>
- ✓ Fjerner og forebygger biofilm<sup>1,5,7,22</sup>



### Udvalgte Prontosan®referencer:

- 1) Cutting KF. Addressing the challenge of wound cleansing in the modern era. Br J Nurs 2010;19(1):24-29.
- 2) Andriessen AE, Eberlein TE. Assessment of a wound cleansing solution in the treatment of problem wounds. Wounds 2008;20(6):171-175.
- 5) Eberlein T, Assadian O. Clinical use of polyhexanide on acute and chronic wounds for antiseptics and decontamination. Skin Pharmacol Physiol 2010;23(Suppl 1):45-51.
- 7) Selpp HM, Hofmann S, Hack A, Skowronsky A, Hauri A. Efficacy of various wound irrigation solutions against biofilms. ZfW 2005;4(5):160-163.
- 8) Romanelli M, Dini V, Barbanera S, Bertone MS. Evaluation of the efficacy and tolerability of a solution containing propyl betaine and polyhexanide. Skin Pharmacol Physiol 2010;23(Suppl 1):41-44.
- 9) Durante CM, Greco A, Sidali O, et al. Evaluation of the effectiveness of a polyhexanide and propyl betaine-based gel in the treatment of chronic wounds. Minerva Chir. 2014 Oct;69(5):283-92.
- 11) Moeller A, Nolte A, Kaehn K. Experiences in using polyhexanide containing wound products in the management of chronic wounds - results of a methodical and retrospective analysis of 953 cases. Wundmanagement 2008;3:112-117.
- 15) Valenzuela A, R., Perucho N, S. The effectiveness of a 0.1 % polyhexanide gel. Rev ROL Enf 2008;31(4):247-252.
- 22) Bjørnholt T, et al., World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) Position Document: Management of Biofilm, Wounds International 2016

# Prontosan® Sårskyllevæske, Prontosan® Sårigel og Prontosan® Sårigel X Til skylning og oprensning af sår med biofilm

## Indikation

- Fjernelse af belægninger og biofilm i kroniske, akutte og inficerede sår, samt stråleskadede hud og kemisk udløste sår
- Prontosan® Sårskyllevæske/ Sårigel: 1.-2. grads forbrændinger
- Sårigel X: 1.-3. grads forbrændinger
- Reduktion af risikoen for infektion i såret
- Skyllevæske ifm. NPWTi-d
- Opløsning af fastgroede sårbandager

## Egenskaber

- Løser og fjerner fibrinbelægninger, cellerester, biofilm, nekrotisk væv mm.
- Forebygger infektion
- Sikrer et miljø der fremmer sårheling
- Reducerer hurtigt ubehagelig sår lugt
- Smertefrit for patienten
- Økonomisk i brug, helingstiden reduceres
- Holdbar i 8 uger efter anbrud, bortset fra Prontosan® sårskyllevæske ampul, der er til engangsbrug
- Til gentagen og langvarig brug
- Prontosan® Adaptor passer til V.A.C. VeraLink™ kassetten.

## Produktbeskrivelse

- Lugtfri, steril brugsklar opløsning bestående af polyhexanid og betain, i gelversioner tillige glycerol og hydroxyethylcellulose
- Høj vævstolerance
- Alle Prontosan® produkter er CE mærkede, klasse III, medicinsk udstyr

## Sårrensning med Prontosan®


### Optimal forberedelse

Såret skylles/aftørres med Prontosan® Sårskyllevæske for at fjerne løse belægninger. Dette er tilstrækkeligt, hvis det er et akut sår eller et kronisk ukompliceret mindre sår. Ved større kroniske og/eller svært tilgængelige sår, vædes en meche med Prontosan® Sårskyllevæske. Denne lægges på såret i op til 15 minutter. Afslut med at aftørre såret med en kompres.

Den bedste sårrensning ses i kombination med efterfølgende brug af Prontosan® Sårigel eller Prontosan® Sårigel X.

### Behandling af overfladiske/dybe sår

Såroverfladen dækkes med et 3-5 mm lag af Prontosan® Sårigel eller Prontosan® Sårigel X. Derefter bandageres såret som sædvanligt. Gelen må være i såret i op til 7 dage.



Varenr.	Produktnavn	Størrelse	Stk. pr. æske	Stk. pr. karton
400484	Prontosan® Sårskyllevæske, ampul	24 x 40 ml	24	192
400415	Prontosan® Sårskyllevæske	350 ml	10	10
400446	Prontosan® Sårskyllevæske	1000 ml	1	10
3908437	Prontosan® Adaptor til NPWTi-d		10	160
400515	Prontosan® Sårigel	30 ml	20	20
400517	Prontosan® Sårigel X	50 g	1	20
400508	Prontosan® Sårigel X	250 g	1	20